


公众如何预防?

9


- 日常生活中**避免接触**猴痘病例或有可疑症状者。
- 性活跃人群特别是MSM人群**避免高危行为**，降低感染和传播风险。
- 前往猴痘流行地区，提前了解当地猴痘疫情情况，做好个人防护，**避免和野生动物接触**。遵守国家出入境管理相关规定，**配合做好出入境检验检疫**。



怀疑自己感染了?? 怎么办?

及时到正规医疗机构**皮肤（性病）科、肛肠科、感染科**等就诊，主动告知医生流行病学史及性接触史，医生会给予相应的诊断、检测和治疗。


10



@深圳疾控

MPOX VIRUS

这些行为! 容易传播猴痘病毒



猴痘防护指南



@深圳疾控

什么是猴痘？

1

猴痘是由猴痘病毒引起的人兽共患传染病。

传染源包括猴痘病毒感染者、感染猴痘病毒的啮齿类动物和灵长类动物。

自2023年9月20日起，我国将猴痘纳入乙类传染病进行管理。



猴痘是怎么传播的？

猴痘主要通过“亲密接触”传播：

直接接触：

接触患者的皮疹、疱疹液、血液或性接触等。



污染物接触：

接触被病毒污染的床单、衣物或毛巾等。



特定情景下飞沫：

仅在长时间、面对面的近距离接触时，通过（如照护、同居等）呼吸道飞沫传播。



感染后有哪些典型症状？

3

皮疹为最常见的症状，出疹前会出现发热、头痛、乏力、淋巴结肿大等现象。

皮疹多见于面部和四肢，也可出现在口腔、肛门、生殖器部位，肛门皮疹易引起细菌感染，出现脓肿、溃疡后影响排便。

面部和四肢

口腔区域



哪些人更容易“中招”？

4

人群普遍易感。

任何与有猴痘症状者密切接触的人都有感染风险，包括皮肤对皮肤（如触摸或阴道性交/肛交）、口对口（如接吻）、或口与皮肤接触（如口交）。

有多个性伴侣的人感染猴痘的风险更高。

目前报告病例多数集中在男男性行为者中，女性亦可通过性接触感染。

5

为什么男男性行为者（MSM）风险较高？



由于该群体接触猴痘病原风险较高，且部分伴有HIV合并感染（免疫力较低），病毒更容易通过密切接触高效传播。

潜伏期有多长？

猴痘的潜伏期一般为5~21天，多为6~13天。

6

潜伏日程

病程及严重程度如何？

猴痘病程约2-4周，免疫力低下病例的病程可能较长。

重症和死亡病例主要为儿童、孕妇和免疫力低下人群。

7



8

目前我国有猴痘疫苗吗？

我国目前尚无获批上市的猴痘疫苗。

